BIBLIOGRAFIA. — FORSTER, W. & WOHLFAHRT, T. A. *Die Schmetterlinge Mitteleuropas*, Stuttgart, Editó Franckh'sche Verlagshandlung W. Keller & Co. Vol. I: Biologie der Schmetterlinge, 1-202, 1954. Vol. II: Tagfalter (Diurna) Rhopalocera und Hesperiidae, 1-126 y 28 láminas a todo color, 1955.

Aunque el tema es extralimital para nuestra fauna, merece ser comentada esta obra, proyectada en 4 volúmenes que aparecen por entregas, no sólo por la exactitud de su confección científica a cargo de dos especialistas conocidos, en especial el Dr. Forster, que dos veces estuvo en nuestro país, sino también por la edición cuidada, artística y bellamente exacta de su texto y de las soberbias láminas a todo color pintadas por el segundo autor. El tomo primero es un verdadero compendio de lepidopterología general en el que se estudian desde los métodos de caza, preparación y conservación de los ejemplares hasta los problemas genéticos, sin sobrepasar la morfología, anatomía y biología, todo ello completado con útiles nociones sistemáticas. En el segundo tomo se tratan todas las especies del área considerada con la nomenclatura genérica al día, dando de cada especie datos biológicos, ecológicos y geográficos, además de una escueta descripción que completa a las soberbias ilustraciones. — R. N. ORFILA.

BIBLIOGRAFIA. — MATEU, J. 1955. *Revisión de los géneros Mimodromius Chaudoir y Mimodromites Mateu (Col. Carabidae).* — Archivos del Instituto de Aclimatación de Almería, IV: 63-103, 54 fs., 17 tab.

Es éste un denso estudio sistemático, morfológico y filogenético de estos dos géneros de Carabidae, basado en el material de casi todas las colecciones argentinas, oficiales y particulares, puestas a disposición del prolijo especialista español. *Mimodromites* es género nuevo y se sustituye *Callidula* Chaudoir 1876 (non. Hubner 1816) por *Chaudoirina* nom. nov. De las 18 especies conocidas, 3 pasan a *Mimodromites*, 3 quedan en "insertae saedis" y se describen 11 especies nuevas argentinas, chilenas, bolivianas y peruanas. El autor ha dado importancia capital al estudio de los genitales para caracterizar las especies, reduciendo a justos límites los factores cromáticos, infortunadamente con tanto predicamento todavía en Coleoptera. Hace luego consideraciones zoogeográficas y filogenéticas. Es un valioso aporte al conocimiento de este grupo de Lebiinae. — R. N. ORFILA.